Vallenar Vive el Desierto Florido

I.Municipalidad de Vallenar

VAQUITA DE ATACAMA

GYRIOSOMUS ATACAMENSIS FAIRMAIRE

Familia: Tenebrionidae

Distribución: Desde dunas costeras del parque Nacional Llanos de Challe hasta Llanos de Pajonales.

Historia Natural: Es un género endémico del norte de chile, el cual posee solo dos especies , ambas presentes en el Parque Nacional LLanos de Challe. Geoborus es de los pocos tenebriánidos voladores chilenos que se pueden observar durante el dia.

Vallenar Vive el Desierto Florido

I.Municipalidad de Vallenar

VAQUITA

GYRIOSOMUS PLANICOLLIS GEBIEN

Familia: Tenebrionidae
Distribución: Desde dunas costeras de Caldera hasta Vallenar.
Historia Natural: Es una especie endémica de las dunas y planicies costeras de Atacama, como todos los Gyriasomus, su periodo de actvidad está relacionado con la expresión del desierto florido, momento en el cual se alimenta vorazmente de plantas anuales y de exoesqueletos de otros insectos.

Vallenar Vive el Desierto Florido

I.Municipalidad de Vallenar

POLOLO GRANDE CAFÉ

TOMARUS VILLOSUS

Familia: Scarabaeidae
Distribución: Desde Arica hasta Temuco, también registrada en Argentina.
Historia Natural: De tamaño mediano, color castaño rojizo oscuro, antenas y patas del mismo color. Consumen follaje de vegetación del lugar. Al igual que muchas especies de escarabeidos, los adultos son atraídos por la luz.

Vallenar Vive el Desierto Florido

I.Municipalidad de Vallenar

CALASOMA - CARÁBIDO

CALASOMA VAGANS DEJEAN

Familia: Carabidae
Distribución: Desde Paposo (Región de Antofagasta) hasta Valdivia (Región de Los Lagos)
Historia Natural: Calasoma es un gÉnero de distribución mundial. Para América del Sur hay 61 especies de las cuales solo cuatro están presentes en Chile. Suelen alimentarse de larvas de mariposas, coleópteros o langostas.

Vallenar Vive el Desierto Florido

I.Municipalidad de Vallenar

BUPRESTIDO - INSECTO DE COBRE

ETINOGONIA ROITMANI MOORE

Familia: Buprestidae

Distribución: Desde las planicies litorales de la Región de Atacama hasta el norte de la costa de la Provincia del Elqui.

Historia Natural: Los ejemplares de esta especie presentan colores matálicos ya sean tonos cobrizos o dorados oscuros. Los adultos suelen dormir sobre plantas o piedras y al verse amenazados suelen recoger sus patas y lanzarse al suelo desde las ramas. Suelen estar activos durante las horas de mayor calor.

Vallenar Vive el Desierto Florido

I.Municipalidad de Vallenar



TENEBRIO - TEATINO

NYCTERINUS SPP

Familia: Tenebrionidae
Distribución: Desde Antofagasta hasta Chiloe. Es posible que la especie que se encuentra en Llanos de Challe sean endémicas de la formación vegetacional del Desierto Costero de Huasco.
Historia Natural: Gregarios y de hábitos nocturnos, se alimentan de detritos de origen vegetal, durante el dia se esconden debajo de piedras , a diferencia de los demás tenebriónidos del parque , se pueden observar activos durante todo el año

Vallenar Vive el Desierto Florido

I.Municipalidad de Vallenar



¿ QUE SON LOS COLEÓPTEROS ?

Son una orden de insectos
que corresponden al grupo más abundante
y diverso de la tierra, con aproximadamente 300.000 especies descritas. Cabe destacar la directa relación de la entomofauna, con el desierto florido, ya que una vez desarrollada la floración, los insectos se alimentan y polinizan las floresque dan vida al desierto florido.

Vallenar Vive el Desierto Florido

I.Municipalidad de Vallenar

DESIERTO FLORIDO

¿Conoces a sus principales polinizadores?

Vallenar Vive el Desierto Florido

I.Municipalidad de Vallenar

VAQUITA

Geoborus rugipennis Solier

Familia: Tenebrionidae
Distribución: Desde Caldera hasta Los Vilos
Historia Natural: Es un género endémico del norte de chile, el cual posee solo dos especies , ambas presentes en el Parque Nacional LLanos de Challe. Geoborus es de los pocos tenebriánidos voladores chilenos que se pueden observar durante el dia.

Vallenar Vive el Desierto Florido

I.Municipalidad de Vallenar

VAQUITA

GYRIOSOMUS KINGI REED

Familia: Tenebrionidae
Distribución: Desde Carrizal bajo hasta Freirina.
Historia Natural: Es una especie endémica del desierto costero del Huasco, cuyas poblaciones en año con fenómeno intenso han llegado a representar el 74,4% de la diversidad total de artrópodos en el parque Llanos de Challe. Siendo un recurso trófico importante para predadores como el zorro, bandurrias, escorpiones, arañas pollitos etc.